

QUESTIONNAIRE N° 2 : Autoquestionnaire (à renvoyer par courrier après la visualisation du film ; ou à remettre à l'investigateur)

II – QUESTIONNAIRE POST-VIDEO

B1. Maintenant que vous avez vu le film, vous estimez-vous capable de mesurer votre tension vous-même en respectant bien les instructions indiquées dans la cassette et sur la fiche ?

- oui
- non
- je ne sais pas

B2. Les meilleurs tensiomètres sont ceux qui s'adaptent :

- au bras
- au poignet
- au doigt

B3. Pour prendre sa tension soi-même, il faut être :

- assis
- debout
- couché
- je ne sais pas

B4. À domicile, il faut mesurer sa tension :

- le matin seulement
- le matin et le soir
- le soir seulement
- le matin, le midi et le soir
- le midi seulement
- je ne sais pas

B5. À domicile, il vaut mieux mesurer sa tension :

- avant de prendre ses médicaments
- plus d'une heure après les avoir pris
- je ne sais pas

B6. De façon générale, et sans parler de votre cas personnel, la normale de la tension avec l'automesure à domicile est (entourez le bon chiffre) :

Pour la pression systolique :120	Pour la pression diastolique : 70
125	75
130	80
135	85
140	90
145	95
150	100

je ne sais pas

B7. Possédez-vous un tensiomètre ?

oui

non

B8. Si non, envisagez-vous d'acheter prochainement un appareil de mesure sachant qu'il n'est pas remboursé par la sécurité sociale ?

oui

non

je ne sais pas

B9. Avez-vous accès à Internet ?

oui

non

B10. Si oui, avez-vous visité le site < automesure.com > consacré à l'automesure de la tension ?

oui

non

B11. La durée de ce film vous paraît :

trop long

- comme il faut
- trop court

B12. Les explications données dans ce film sont :

- claires
- trop compliquées
- pas assez détaillées